

Вакцинацію слід проводити якомога раніше.

Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно заповнювати згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації (STIKO), 2022 р. www.stiko.de



	у тижнях		у місяцях								у роках						Терміни наступної вакцинації	
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17		с 18
Ротавіруси	G1 ^a		G2	(G3)														
Правець		G1	N	G2	N	G3 ^c			N			A1	N	A2	N			A ^e
Дифтерія		G1	N	G2	N	G3 ^c			N			A1	N	A2	N			A ^e
Судомний кашель Коклюш		G1	N	G2	N	G3 ^c			N			A1	N	A2	N		A3 ^e	N
Гемофільна інфекція інфекція <i>Typh</i>		G1	N	G2	N	G3 ^c			N									
Дитячий параліч ^b Поліомієліт		G1	N	G2	N	G3 ^c				N				A1			N	
Гепатит В		G1	N	G2	N	G3 ^c						N						
Пневмокок		G1	N	G2	N	G3 ^c			N									S ^g
Менінгокок С							G1					N						
Кір						G1	N		G2				N					S ^h
Свинка, краснуха						G1	N		G2				N					
Вітрянка Вітряна віспа						G1	N		G2				N					
ВПЛ Вірус папіломи людини													G1 ^d G2 ^d	N				
Оперізуючий герпес																		G1 ^h G2 ^h
Грип Інфлюєнца																		S (щороку)



ПОЯСНЕННЯ

G БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ (до 3-х часткових щеплень G1 - G3)

S СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ

A РЕВАКЦИНАЦІЯ

N ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ (Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або Завершення неповної серії вакцинацій)

U Скринінгове обстеження

J Обстеження підлітків (J1 у віці 12–14 років)

a Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.

b Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.

c Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.

d Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами Потрібна 3-я доза.

e Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).

f Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.

g Вакцинація 23-валентною полісахаридною вакциною.

h Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізуючого герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.

* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.